

公衆浴場の
衛生管理に

バストップJ 錠 剤

日曹高度サラシ粉70 顆粒剤

公衆浴場の浴槽水は、入浴者の持ち込む汚れのために汚染されています。
入浴者の健康と安全を守るために、残留塩素の適切な管理は絶対にかかせません。

“バストップJ”と“日曹高度サラシ粉70”は、浴槽水の残留塩素管理を簡単に行うことのできる無機塩素系製剤です。

雑菌の生成を防止 (大腸菌O157対策に)

浴槽水の残留塩素値を適当に保つことで、大腸菌や法定伝染病の原因となる雑菌等の生成を防止します。

浴槽のぬめりを防止

更に残留塩素を適当に保つことは、浴槽のぬめり付着を防止します。

汚れ・脂の分解

残留塩素は、浴槽水に持ち込まれる有機物(汚れ)や人体から出る脂を分解します。これにより水の濁りを防止し、水の交換回数を減らすことが可能です。

pHを中性に保つ

浴槽の水は酸性に傾くと設備を腐食させ、アルカリ性に傾くと製剤の効力を弱めるなどの悪影響を及ぼします。他の塩素系製剤とは異なり、水のpHを変動(酸性やアルカリ性に)させないので安心してご使用いただけます。



バストップJ



高度サラシ粉70

○製品規格

	バストップJ	日曹高度サラシ粉70
剤型	20g錠剤	顆粒剤
有効塩素含有率	60%	70%
内容量	20kg(2kg×10袋)	20kg(2kg×10袋)

○バストップJの使用方法

バストップJは、投入後約4～5時間かけてゆっくり溶解しながら残留塩素を保ちます。また、これにより過圧の上昇を防ぎます。

投入場所

ヘアーキャッチャー(ストレーナー)の網の中に投入します。

標準投入場所

浴槽水1m³当たり、2～3錠のバストップJを投入してください。なお、入浴者数が多く水質が悪い場合などは、状況に応じて投入量を増やしてください。

○日曹高度サラシ粉70の使用方法

日曹高度サラシ粉70は、溶けやすい顆粒剤です。残留塩素が不足しているときに、急激に残留塩素を増加させる場合などに有効です。また、人体から出る脂により過圧が上がったとき、脂を分解するために使用することもできます。また、その他の用途について以下の表を参考にしてください。

※ここでのバケツ1杯とは約14ℓの水となります。

用	途	高度サラシ粉70投入量	残留塩素濃度	備 考
浴湯水	水質管理(除菌・ぬめり防止)	水1m ³ に2～3g	1.4～2mg/ℓ	持続効力のある錠剤タイプも用意しております。
	有機物(脂)の分解	水1m ³ に7～14g	5～10mg/ℓ	投入後ろ過機を終日運転して下さい。
野菜果物	生野菜、果物の除菌 漬物用野菜の前処理	バケツ1杯の水に2g	100mg/ℓ	水洗後10分位浸します。 漬物が酸っぱくなるのを防ぎます。
鮮魚介類	鮮魚、貝類の除菌、防臭、腐敗防止 さしみの除菌	バケツ1杯の水に1g	50mg/ℓ	時々上から、液をふりかけて下さい。 さしみは材料を同液でしぼったふきんで ふいてから用いて下さい。
食器調理具	食器、まな板、調理台、冷蔵庫、食器棚 の除菌、防臭 哺乳びんの除菌	バケツ1杯の水に2g	100mg/ℓ	食器、まな板は洗い上がり後1分間浸して下さい。 牛乳びん、缶は水洗後浸して下さい。 食器棚、冷蔵庫等は同液でしぼったふきんでふいて下さい。臭いやカビを防ぎます。
	茶わんの茶しぶ取り	茶わん1杯の水に1g	5,000mg/ℓ	数分浸しておくととてもきれいになります。
ふきん類	ふきん、おしぼり、手ぬぐい、雑布の 除菌、脱臭、漂白	バケツ1杯の水に4g	200mg/ℓ	衛生的な処理ができる上、10分位浸しておくと、 白くきれいになります。
お掃除に	病室、浴室、便器、便所、洗面器、 たんつぼ、タイル、たたみ、ろうかの 衛生的掃除、しみぬき、ドブの脱臭	バケツ1杯の水に30g	1,500mg/ℓ	浴室やタイルには同液を直接流し、その他は 同液で雑巾がけをして下さい。 ドブの防臭には持続効果のあるハイクロン錠剤 を用意しております。
洗濯	白木綿、麻、テトロンの漂白 (色物、毛織物、絹はさけて下さい。) おむつの除菌、脱臭、漂白	バケツ1杯の水に 10～20g	500 ↓ 1,000mg/ℓ	よく溶かしてから、20分位浸し、水洗します。 洗剤で洗った後の方がきれいに仕上がります。



バストップJ・日曹高度サラシ粉70をご使用の前に、
必ず製品に記載されている取扱上の注意をお読みください。